

⊙ "Uso actual de los Inhibidores de Integrasa"

Current use of Integrase Inhibitors.

Roberto Arduino, MD.


◆ ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en relación a la tasa de supresión virológica alcanzada por los pacientes en los estudios BENCHMRK según el número de ARV activos en el tratamiento optimizado?

- a) Los pacientes que recibieron Raltegravir sin ARV activos lograron una supresión virológica similar a lo que recibieron 1 ARV activo en el tratamiento optimizado.
- b) Los pacientes que recibieron Raltegravir sin ARV activos lograron supresión virológica similar a lo que recibieron 2 ARV activos en el tratamiento optimizado.
- c) Los pacientes que recibieron Raltegravir con 2 ARV activos lograron una supresión virológica superior a lo que recibieron 0 ó 1 ARV activo en el tratamiento optimizado.
- d) No sé; vine a aprender.


PRE	%	n
a	0,0%	0
b	0,0%	0
c	7,7%	2
d	92,3%	24
Total	100,0%	26

POST	%	n
a	2,7%	1
b	21,6%	8
c	73,0%	27
d	2,7%	1
Total	100,0%	37

n=26



n=37



**NOTA EDITORIAL:** Cambio de conocimiento: **+848.0%**. Excelente, con gran reducción en la proporción de participantes desconocedores del estudio; se ratifica que el Raltegravir es definitivamente más efectivo cuando se utiliza con al menos dos medicamentos activos que cuando se acompaña con solamente uno activo o menos.