

⊙ **Atención farmacéutica en los programas de atención integral en VIH/SIDA.**  
**Pharmaceutical Care in comprehensive care programs for HIV/AIDS patients.**

*Pedro Amariles, QF., Ph.D.*


◆ **Respecto al seguimiento farmacoterapéutico (SFT) de pacientes con VIH/Sida, una de las siguientes afirmaciones es CIERTA:**

- a) El SFT de pacientes con VIH/Sida debe limitarse a mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral
- b) El SFT de pacientes con VIH/sida tiene como objetivo principal contribuir con el médico a la consecución de los mejores resultados en salud con la utilización de los medicamentos que utiliza el paciente.
- c) El SFT de pacientes con VIH/Sida debe limitarse a dispensar los medicamentos y a resolver las inquietudes que tiene el paciente con el tratamiento antirretroviral.
- d) El SFT de pacientes con VIH/Sida requiere solo de la participación del Químico Farmacéutico.
- e) Todas son ciertas.
- f) No sé; vine a aprender.


PRE	%	n
a	7,7%	2
b	61,5%	16
c	0,0%	0
d	7,7%	2
e	15,4%	4
f	7,7%	2
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>26</b>

POST	%	n
a	0,0%	0
b	64,7%	22
c	0,0%	0
d	5,9%	2
e	26,5%	9
f	2,9%	1
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>34</b>

n=26



n=34



**NOTA EDITORIAL:** Cambio de conocimiento: **+5.2%**, aunque bajo, permite ratificar que la mayoría de los participantes conocen claramente el objetivo fundamental del seguimiento fármaco terapéutico (SFT) de pacientes con VIH-Sida.