


♦ **¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que podría ser la mejor y más racional y usual combinación de antirretrovirales para pacientes colombianos con primera falla virológica detectada tempranamente?**

- A. 1-2 NRTIs activos + IP reforzado plenamente activo.**
- B. 1 NNRTI plenamente activo + IP reforzado activo +/- I. Integraza ú otra familia.**
- C. 1-2 NRTIs activos + IP reforzado plenamente activo + I. Integraza ú otra familia.**
- D. Ninguna de las anteriores, tengo una mejor opción.**
- E. No sé, vine a aprender.**



NOTA EDITORIAL: Cambio de conocimiento: **-13.2%**. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las primeras fallas virológicas detectadas tempranamente y documentadas con estudio genotípico en Colombia cursan con rebotes pequeños de la carga viral y se asocian con resistencias a los NNRTIs (más usados dentro de los regímenes de “primera línea” que los IPs) y a alguno(s) de los NRTIs (con poca afectación de los timidínicos), la mejor opción para el primer rescate puede seguir siendo la combinación de 1-2 NRTIs activos + IP reforzado plenamente activo. La inclusión de nuevos NNRTIs (como Etravirina) y/o inhibidores de integrasa o antagonistas del CCR5, puede limitarse a situaciones especiales (ej. carga viral elevada, mayor número de mutaciones y afectación de medicamentos).